Cure palliative

Prof. Walter Ricciardi

Roma, Dicembre 2007

istituto di igiene U.C.S.C.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Cure palliative

Le **cure palliative**, secondo la più recente definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ' ... *sono un approccio che migliora la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie affrontando i problemi delle malattie ad esito infausto, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di un'identificazione precoce e di un'impeccabile valutazione e trattamento del dolore e degli altri problemi, fisici, psicologici e spirituali.*

Caratteristiche dei pazienti oncologici con malattia in fase terminale (1) (valori percentuali)

	Nord Ovest	Centro Nord Est	Centro	Sud e Isole	Italia
Deceduti per tumore	44.453	30.528	33.134	35.885	144.000
ETA' AL DECESSO					
18-54	5,20	7,00	4,70	9,90	6,60
55-64	14,40	13,30	9,70	12,10	12,50
65-79	48,70	42,60	50,30	52,20	48,70
80 +	31,70	37,00	35,40	25,90	32,20
SESSO					
Maschi	54,30	55,40	60,80	59,90	57,40
Femmine	45,70	44,60	39,30	40,10	42,60
TITOLO DI STUDIO					
nessuno - elementare	60,40	73,70	71,00	65,50	66,90
media inferiore	20,40	13,60	14,10	19,20	17,20
media superiore	16,60	10,70	11,60	13,10	13,30
laurea	2,60	2,00	3,30	2,20	2,50

Beccaro M, Costantini M, Merlo DF. Inequity in the provision of and access to palliative care for cancer patients. Results from the Italian survey of the dying of cancer (ISDOC). *BMC Public Health*, (in press).

Le caratteristiche dei pazienti oncologici con malattia in fase terminale (2) (valori percentuali)

	Nord Ovest	Centro Nord Est	Centro	Sud e Isole	Italia
Deceduti per tumore	44.453	30.528	33.134	35.885	144.000
STATO CIVILE					
coniugato	54,0	59,1	65,7	64,5	60,4
single	46,0	40,9	34,3	35,6	39,6
TUMORE PRIMITIVO					
testa collo	2,5	2,8	1,2	2,3	2,2
apparato digerente	36,6	33,7	37,7	36,0	36,1
apparato respiratorio	21,4	21,2	24,0	19,8	21,6
mammella	9,9	12,7	5,8	11,1	9,8
sistema genito urinario	13,9	15,9	16,4	12,8	14,7
tumori ematologici	6,4	6,0	5,6	11,5	7,4
altri e non specificati	9,3	7,7	9,3	6,6	8,3

Beccaro M, Costantini M, Merlo DF. Inequity in the provision of and access to palliative care for cancer patients. Results from the Italian survey of the dying of cancer (ISDOC). *BMC Public Health*, (in press).

Luogo di cura dei pazienti oncologici negli ultimi tre mesi di vita

Luogo di cura	Nord Ovest	Centro Nord Est	Centro	Sud e Isole	Italia
	%	%	%	%	%
a casa	89.1	83.0	92.7	97.8	90.8
in RSA	11.9	13.5	6.5	0.9	8.3
in ospedale (> 24 h)	66.4	73.5	63.5	51.2	63.4
in hospice	0.5	1.4	1.1	-	0.7

Nota: la somma è superiore a 100 perchè più pazienti sono stati in più luoghi

Beccaro M, Costantini M, Merlo DF. Inequity in the provision of and access to palliative care for cancer patients. Results from the Italian survey of the dying of cancer (ISDOC). *BMC Public Health*, (in press).

Luogo di decesso dei pazienti oncologici

Luogo di decesso	Nord Ovest	Centro Nord Est	Centro	Sud e Isole	Italia
	%	%	%	%	%
Casa di residenza	46.0	25.7	55.5	93.5	55.7
Altra casa	1.8	2.5	4.2	0.5	2.2
Ospedale	42.4	60.2	33.0	4.6	34.6
Hospice	0.5	1.4	1.1	-	0.7
RSA	9.2	10.3	5.2	0.9	6.5
Ambulanza	0.2	-	1.0	0.5	0.4
TOTALE	100	100	100	100	100

Beccaro M, Costantini M, Giorgi Rossi P, Miccinesi G, Grimaldi M, Bruzzi P. Actual and preferred place of death of cancer patients. Results from the Italian Survey of the Dying of Cancer (ISDOC). J Epidemiol Comm Health 2006; 60:412-416.

Dove vorrebbero morire i pazienti oncologici e dove effettivamente muoiono



Beccaro M, Costantini M, Giorgi Rossi P, Miccinesi G, Grimaldi M, Bruzzi P. Actual and preferred place of death of cancer patients. Results from the Italian Survey of the Dying of Cancer (ISDOC). J Epidemiol Comm Health 2006; 60:412-416.

Comunicazione della diagnosi e della prognosi

	Nord Ovest	Centro Nord Est	Centro	Sud e Isole	Italia
	%	%	%	%	%
Informati sulla diagnosi	42.9	43.4	33.0	28.8	37.2
Informati sulla prognosi	15.1	13.8	13.4	7.3	12.5

1.Costantini M, Morasso G, Montella M, Borgia P, Cecioni R, Beccaro M, Sguazzotti E, Bruzzi P. Diagnosis and prognosis disclosure among cancer patients. Results from an Italian mortality follow-back survey. Ann Oncol 2006; 17:853-859.
2.Surbone A, Ritossa C, Spagnolo AG. Evolution of truth-telling attitudes and practices in Italy. Crit Rev Oncol Hemat 2004; 52:165-172.

Il paziente o qualcuno della famiglia paga per qualche aspetto dell'assistenza?

	Nord Ovest	Centro Nord Est	Centro	Sud e Isole	Italia
	%	%	%	%	%
SI	70.7	51.4	70.6	84.3	69.9
NO	29.3	48.6	29.4	15.7	30.1
TOTALE	100	100	100	100	100